

Bài I (2 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{x+3}$ và $B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} - \frac{2-5\sqrt{x}}{x-4}$ với $x \geq 0; x \neq 4$.

- 1) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 16$.
- 2) Rút gọn biểu thức $P = A.B$.
- 3) Tìm tất cả giá trị x để $(6x+18).P \geq x+9$.

Bài II (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

1) Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 3 giờ 45 phút thì xong. Nhưng họ chỉ làm chung trong 3 giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người xây xong bức tường trong bao lâu?

2) Một thùng nước hình trụ có chiều cao bằng đường kính đáy và bằng 1m. Thùng nước này có thể đựng được $1m^3$ nước không? Tại sao? (Lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài III (2,5 điểm)

- 1) Giải phương trình $2x - 5 + 3\sqrt{2x-1} = 0$
- 2) Cho hàm số $y = (m-1)x + 3$, $m \neq 1$ có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm M(1; 4). Với m vừa tìm được, hãy cho biết đường thẳng (d) có song song với đường thẳng $y = -x - 1$ không? Vì sao?

b) Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng (d) tiếp xúc với đường tròn (O; 1) trong đó O là gốc tọa độ.

Bài IV (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB. Lấy điểm K bất kì thuộc cung AC, kẻ KH vuông góc với AB tại H. Tia AC cắt HK tại I, tia BI cắt nửa tròn tại điểm E.

- 1) Chứng minh tứ giác BHIC nội tiếp;
- 2) Chứng minh $AI.AC = AH. AB$ và tổng $AI.AC + BI.BE$ không đổi.
- 3) Chứng minh HE vuông góc với CE và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEH nằm trên đường thẳng cố định khi K di động trên cung AC.

Bài V (0,5 điểm) Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \sqrt{3a+bc} + \sqrt{3b+ca} + \sqrt{3c+ab}$.


Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm!

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG – LẦN III (29/5/2021)

BÀI	Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
Bài I 2 điểm	1 (0,5điểm)	1) Tính giá trị biểu thức A tại $x=16$;	0,5
		Thay $x=16$ (TMĐK) vào biểu thức A, ta có :	0,25
		$A = \frac{\sqrt{16}-2}{16+3} = \frac{4-2}{19} = \frac{2}{19}$	0,25
	2 (1 điểm)	2) Rút gọn biểu thức $P = A.B$	1
		$B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} - \frac{2-5\sqrt{x}}{x-4} = \frac{(\sqrt{x}-1).(\sqrt{x}-2)-2+5\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2).(\sqrt{x}+2)}$	0,25
		$= \frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2).(\sqrt{x}+2)}$	0,25
		$= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$	0,25
		$\Rightarrow P = A.B = \frac{\sqrt{x}-2}{x+3} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} = \frac{\sqrt{x}}{x+3}$ Vậy $P = \frac{\sqrt{x}}{x+3}$ với $x \geq 0; x \neq 4$.	0,25
	3 (0,5 điểm)	3) Tìm x để $(6x+18).P \geq x+9$.	0,5
		Ta có : $(6x+18).P \geq x+9$ $\Leftrightarrow 6(x+3) \cdot \frac{\sqrt{x}}{x+3} \geq x+9$ $\Leftrightarrow x-6\sqrt{x}+9 \leq 0$	0,25
		$\Leftrightarrow (\sqrt{x}-3)^2 \leq 0$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}-3=0$ $\Leftrightarrow x=9(TM)$ Vậy với $x=9$ thì $(6x+18).P \geq x+9$.	0,25
Bài II 2 điểm	1 1,5 điểm	Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người xây xong bức tường trong bao lâu?	1,5
		Gọi x là thời gian để người thứ nhất xây một mình xong bức tường $\left(h, x > \frac{15}{4}\right)$ Gọi y là thời gian để người thứ hai xây một mình xong bức tường $(h, y > \frac{15}{4})$	0.25
		Trong 1 giờ, người thứ nhất xây được: $\frac{1}{x}$ (bức tường) Trong 1 giờ, người thứ hai xây được: $\frac{1}{y}$ (bức tường)	

		Trong 1 giờ, cả hai người xây được: $\frac{1}{15} = \frac{4}{15}$ (bức tường) Ta có PT: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{15}$ (1)	0,25
		Trong 3 giờ, người thứ nhất xây được: $\frac{3}{x}$ (bức tường) Trong 5 giờ, người thứ hai xây được: $\frac{5}{y}$ (bức tường) Ta có PT: $\frac{3}{x} + \frac{5}{y} = 1$ (2)	0,25
		Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{15} \\ 3 \cdot \frac{1}{x} + 5 \cdot \frac{1}{y} = 1 \end{cases} \quad (I)$	0,25
		Đặt: $\begin{cases} a = \frac{1}{x} \\ b = \frac{1}{y} \end{cases}$ Hệ (I) trở thành: $\begin{cases} a + b = \frac{4}{15} \\ 3a + 5b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{6} \\ b = \frac{1}{10} \end{cases}$ Do đó: $\begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 10 \end{cases} \quad (\text{TM})$	0,25
		Người thứ nhất xây xong bức tường trong 6 giờ. Người thứ hai xây xong bức tường trong 10 giờ.	0,25
Bài	2 0,5 điểm	Thể tích	0,5
		Ta có $h = d = 2r = 1$ $\Rightarrow r = \frac{1}{2} (m)$ Mà thể tích của thùng nước hình trụ là: $V = \pi r^2 \cdot h = \pi r^2 2r = 2\pi \cdot r^3 = 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \approx 0,79(m^3)$	0.25
		Do $0,79(m^3) < 1m^3$ Vậy thùng nước này không thể đựng được $1m^3$ nước.	0.25
	1) 1 điểm	1) Giải phương trình: $2x - 5 + 3\sqrt{2x - 1} = 0$	1

III 2,5 điểm		ĐK: $x \geq \frac{1}{2}$	0,25
		Đặt: $t = \sqrt{2x-1} (t \geq 0)$ $t^2 + 3t - 4 = 0$ Ta có: $\Leftrightarrow (t+4)(t-1) = 0$ $\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} t = -4(KTM) \\ t = 1(TM) \end{cases}$	0,25
		Thay vào ta được: $\sqrt{2x-1} = 1$ $\Leftrightarrow x = 1(TM)$	0,25
		Vậy $x=1$ thỏa mãn đề bài.	0,25
2 1,5 điểm		a) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm M(1; 4). Với m vừa tìm được, hãy cho biết đường thẳng d có song song với đường thẳng $y = -x - 1$ không? Vì sao?	0,75
		Đường thẳng (d): $y = (m-1)x + 3$ ĐK: $m \neq 1$ Do (d) đi qua A(1;4) $\Rightarrow x=1; y=4$ Thay $x=1; y=4$ vào (d) ta được: $4 = (m-1).1 + 3$ $\Rightarrow m = 2(TM)$ Vậy $m = 2$ thì (d) đi qua A(1;4)	0.25
		Thay $m = 2$ vào (d) ta được: $y = x + 3 (*)$	0,25
		Xét đường thẳng (*) và đường thẳng $y = -x - 1$ Do $a \neq a' (1 \neq -1)$ Vậy đường thẳng (*) không song song với đường thẳng $y = -x - 1$	0,25
		b) Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng (d) tiếp xúc với đường tròn (O; 1) trong đó O là gốc tọa độ.	0,75
		Đường thẳng (d): $y = (m-1)x + 3$ Gọi Điểm A, B lần lượt là tọa độ giao điểm của (d) cắt trục tung và trục hoành. Gọi H là hình chiếu của O lên (d). Ta có: $x = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow A(0;3)$ $y = 0 \Rightarrow x = \frac{-3}{m-1} \Rightarrow B(\frac{-3}{m-1}; 0)$	0,25

		$\Rightarrow OA = 3 = 3$ $\Rightarrow OB = \left \frac{-3}{m-1} \right = \frac{3}{ m-1 }$ $\Rightarrow OH = 1 = 1$ Do O là gốc tọa độ, là tâm đường tròn (O;1) tiếp xúc với (d) tại H. $\Rightarrow OH \perp (d)$ Tam giác OAB vuông tại O, Theo HTL ta có: $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{1}{OH^2}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{9} + \frac{1}{\frac{9}{(m-1)^2}} = \frac{1}{1^2}$	0,25
		$\Leftrightarrow 1 + (m-1)^2 = 9$ $\Leftrightarrow (m-1)^2 = 8$ $\Leftrightarrow m-1 = \pm 2\sqrt{2}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 + 2\sqrt{2} (tm) \\ m = 1 - 2\sqrt{2} (tm) \end{cases}$ Vậy $m \in \{1 + 2\sqrt{2}; 1 - 2\sqrt{2}\}$ thỏa mãn đề bài.	0,25
Bài IV (3 điểm)	(3 điểm)	 Vẽ hình	0.25
		1) Chứng minh tứ giác BHIC nội tiếp	0,75
		1) Xét đường tròn (O) Do $KH \perp AB \Rightarrow \widehat{BHI} = 90^\circ$ $\widehat{ICB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)	0,25
		Xét tứ giác BHIC có: $\widehat{BHI} + \widehat{ICB} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$	0,25
		Mà 2 góc ở vị trí đối nhau.	

	$\Rightarrow$ Tứ giác BHIC nội tiếp(dhnb).	0,25
	2)Chứng minh $AI.AC=AH.AB$ và $AI.AC + BI.BE$ không đổi	1
	Chứng minh $\triangle AIH \sim \triangle ABC(g.g)$ $\Rightarrow \frac{AI}{AH} = \frac{AB}{AC}$ $\Rightarrow AI.AC = AB.AH(1)$	0,5
	$\widehat{BEA} = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\triangle BHI \sim \triangle BEA(g.g)$ $\Rightarrow \frac{BH}{BI} = \frac{BE}{AB}$ $\Rightarrow BI.BE = BH.AB(2)$ $AI.AC + BI.BE = AB.AH + AB.BH = AB^2$ Từ (1) và (2) Mà $AB=2R$	0,25
	$\Rightarrow AI.AC + BI.BE = 4R^2$ Do R không đổi. $AI.AC + BI.BE$ Vậy không đổi.	0,25
	3)Chứng minh $HE \perp CE$ và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEH nằm trên đường thẳng cố định khi K di động trên cung AC.	1
	Chứng minh tứ giác IEAH nội tiếp $\widehat{IEH} = \widehat{IAH}$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung IH) Mà $\widehat{CEB} = \widehat{CAB} = \frac{1}{2} \text{SđCB}$	0,25
	Chứng minh $\triangle COA$ vuông cân tại O $\Rightarrow \widehat{CAB} = 45^0$ $\Rightarrow \widehat{CEB} + \widehat{BEH} = 2\widehat{CAB} = 2.45^0 = 90^0$ $\Rightarrow \widehat{CEH} = 90^0$ $\Rightarrow HE \perp CE$	0,25
	Gọi tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEH là O' Gọi M là trung điểm của CO. $\Rightarrow O'M // HO$	0,25
	$\Rightarrow O'M$ là đường trung trực của đoạn thẳng OC. Vậy khi K di động trên cung AC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEH nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng CO cố định.	0,25

Bài V 0,5 điểm	Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \sqrt{3a + bc} + \sqrt{3b + ca} + \sqrt{3c + ab}$.	0,5
	Ta có $Q = \sqrt{3a + bc} + \sqrt{3b + ca} + \sqrt{3c + ab}$. Mà $\sqrt{3a + bc} = \sqrt{(a + b + c)a + bc}$ (Do $a + b + c = 3$) $= \sqrt{a^2 + ab + bc + ca}$ $= \sqrt{(a + b)(a + c)} \leq \frac{(a + b) + (a + c)}{2}$ Áp dụng bất đẳng thức Côsi với 2 số dương 3a, bc ta có: $\sqrt{3a + bc} \leq \frac{(a + b) + (a + c)}{2} \quad (1)$	0,25
	Tương tự ta có : $\sqrt{3b + ca} \leq \frac{(a + b) + (b + c)}{2} \quad (2)$ $\sqrt{3c + ab} \leq \frac{(a + c) + (b + c)}{2} \quad (3)$ Cộng (1) (2) (3) về theo vế $\Rightarrow Q \leq 2(a + b + c) = 6$ Dấu “=” xảy ra khi $a = b = c = 1$ $Q_{\text{Max}} = 6 \Leftrightarrow a = b = c = 1$	0,25

Lưu ý: Học sinh có cách làm khác đúng vẫn cho điểm.