

b) Tìm tất cả các số nguyên tố q , sao cho tồn tại số nguyên dương n để $n^2 + 22q$ là một lũy thừa với số mũ nguyên dương của 11.

Bài 7 (1,0 điểm). Có bốn căn phòng nằm liên tiếp nhau, thành một hàng ngang. Có một con chuột trốn trong các căn phòng đó; mỗi ngày nó trốn trong một căn phòng. Có một chú mèo tìm cách bắt con chuột này. Cứ mỗi tối, mèo ta vào một căn phòng, và nếu con chuột đang trốn ở căn phòng ấy thì nó sẽ bị mèo bắt. Biết rằng, nếu chưa bị mèo bắt mỗi sáng, con chuột lại chạy sang trốn ở căn phòng nằm ngay bên cạnh. Hỏi chú mèo có thể đảm bảo chắc chắn sẽ bắt được con chuột sau tối đa bốn tối hay không? Vì sao?

Bài 8 (0,5 điểm). Cho x, y, z là các số thực lớn hơn 2021, thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{2021}$. Chúng minh rằng, ta có bất đẳng thức sau:

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021}.$$

_____ **HẾT** _____

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO

Bài 1.

a) (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{x(\sqrt{x}-2) + 2(\sqrt{x}-1) + (2x - x\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}$$
$$\text{Ta có: } = \frac{x\sqrt{x} - 2x + 2\sqrt{x} - 2 + 2x - x\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}$$
$$= \frac{2\sqrt{x} - 4}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)} = \frac{2(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)} = \frac{2}{\sqrt{x}-1}$$

b) (0,5 điểm)

$$\text{ta có } x = 3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2$$

$$\text{do đó: } A = \frac{2}{\sqrt{(\sqrt{2}+1)^2} - 1} = \frac{2}{\sqrt{2} + 1 - 1} = \sqrt{2}$$

Bài 2. (1,0 điểm) Theo định lí Vi-ét (thuận và đảo), a, b là các số thực thỏa mãn yêu cầu đề bài khi và chỉ khi :

$$\begin{cases} a \neq -2 & (1) \\ \frac{a}{3} + \frac{1}{a+2} = -a & (2) \\ \frac{a}{3} \cdot \frac{1}{a+2} = b & (3) \end{cases}$$

$$\text{Với } a \text{ thỏa mãn (1) ta có } (2) \Leftrightarrow 4a^2 + 8a + 3 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}, a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Thay } a = \frac{-1}{2} \text{ vào (3) ta được } b = \frac{-1}{9}$$

$$\text{Thay } a = \frac{-3}{2} \text{ vào (3) ta được } b = -1$$

Vậy có tất cả hai cặp số thực a, b thỏa mãn yêu cầu là $\left(\frac{-1}{2}; \frac{-1}{9}\right), \left(\frac{-3}{2}; -1\right)$.

Bài 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 2y + x - 2x^2y = 0 \\ \sqrt{x+1} - \sqrt{16-y} = 3 \end{cases}$$

Điều kiện: $x \geq -1$ và $y \leq 16$. (1)

Với điều kiện đó, ta có:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^3 - 2y + x - 2x^2y = 0 \\ \sqrt{x+1} - \sqrt{16-y} = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} (x-2y)(x^2+1) = 0 \\ \sqrt{x+1} - \sqrt{16-y} = 3 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ \sqrt{2y+1} - \sqrt{16-y} = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} (3) &\Leftrightarrow (\sqrt{2y+1} - 5) - (\sqrt{16-y} - 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2(y-12)}{\sqrt{2y+1}+5} + \frac{y-12}{\sqrt{16-y}+2} = 0 \\ &\Leftrightarrow (y-12) \left(\frac{2}{\sqrt{2y+1}+5} + \frac{1}{\sqrt{16-y}+2} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow y = 12. \end{aligned}$$


Thay $y = 12$ vào (2), ta được $x = 24$.

Cặp số $(x, y) = (24, 12)$ thỏa mãn (1). Vì thế, cặp số đó là nghiệm duy nhất của hệ phương trình đã cho.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 8. Trên cạnh BC , lấy điểm M sao cho $BM = 5$. Gọi N là giao điểm của đường thẳng CD và đường thẳng vuông góc với AM tại A . Gọi I là trung điểm của MN . Hãy tính độ dài đoạn thẳng DI .

Bài 5. Cho $(O_1), (O_2)$ là hai đường tròn, cắt nhau tại điểm A, M , sao cho $\angle O_1AO_2$ là góc tù. Tiếp tuyến tại A của (O_1) cắt (O_2) tại điểm thứ hai B (khác A). Tiếp tuyến tại A của (O_2) cắt (O_1) tại điểm thứ hai D (khác A).

a) (1,0 điểm) Trên cung AD không chứa M của (O_1) , lấy điểm K , khác A và D , sao cho đường thẳng KM cắt cung AB không chứa M của (O_2) tại điểm L , khác A và B . Chứng minh rằng đường thẳng AK song song với đường thẳng BL .



Với giả thuyết $\angle O_1AO_2$ là góc tù, ta có thể hình như ở trên.

Xét (O_1) , ta có:

$\angle AKM = \angle MAB$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây, cùng chắn cung AM không chứa D). (1)


Xét (O_2) , ta có:

$\angle MLB = \angle MAB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung MB không chứa A). (2)

Từ (1) và (2), suy ra, $\angle AKM = \angle MLB$.

Do đó, $AK \parallel LB$ (vì có hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau).

b) (1,5 điểm) Gọi C là điểm đối xứng của A qua M . Chứng minh rằng $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.



Xét (O_1) ta có:

$\angle MDA = \angle MAB$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây, cùng chắn cung AM không chứa D). (3)

Xét (O_2) ta có

$\angle MAD = \angle MBA$ (góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây, góc nội tiếp, cùng chắn cung AM không chứa B) (4)

Từ (3) và (4), suy ra, $\triangle AMD \sim \triangle BMA$.

Do đó, $\frac{MA}{MD} = \frac{MB}{MA}$; mà $MC = MA$ (gt), nên $\frac{MC}{MD} = \frac{MB}{MC}$. (5)

Do trong một tam giác, mỗi góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó, nên cộng (3) và (4), về theo vế, ta được:

$$\angle DMC = \angle CMB \quad (6)$$

Từ (5) và (6), suy ra, $\triangle DMC \sim \triangle CMB$.

Do đó, $\angle DCM = \angle CBM$.

Vì thế, ta có:

$$\begin{aligned}
\angle DCB &= \angle DCM + \angle MCB = \angle CBM + \angle MCB \\
&= 180^\circ - \angle BMC = 180^\circ - (\angle BAM + \angle MBA) \\
&= 180^\circ - (\angle BAM + \angle MAD) \quad (\text{do (4)}) \\
&= 180^\circ - \angle BAD
\end{aligned}$$

Suy ra, $\angle BAD + \angle DCB = 180^\circ$. Do đó, $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.

Bài 6. a) (1,0 điểm) Cho m, p, r là các số nguyên tố thỏa mãn $mp + 1 = r$. Chứng minh rằng $m^2 + r$ hoặc $p^2 + r$ là số chính phương.

Vì m, p là các số nguyên tố nên $mp \geq 4$. Do đó, $r \geq 5$. Mà r là nguyên tố nên r là số lẻ.

Vì thế, $mp = r - 1$ là một số chẵn. Suy ra, trong hai số m, p , có ít nhất một số bằng 2.

- Nếu $m = 2$ thì $r = 2p + 1$. Do đó:

$$p^2 + r = p^2 + 2p + 1 = (p + 1)^2,$$

Là một số chính phương.

- Nếu $p = 2$ thì $r = 2m + 1$. Do đó

$$m^2 + r = m^2 + 2m + 1 = (m + 1)^2 \text{ là một số chính phương}$$

b) Tìm tất cả các số nguyên tố q , sao cho tồn tại số nguyên dương n để $n^2 + 22q$ là một lũy thừa với số mũ nguyên dương của 11.

Giả sử q là số nguyên tố thỏa mãn yêu cầu đề bài. Khi đó, sẽ tồn tại các số nguyên dương

$$n, k \text{ sao cho } n^2 + 22q = 11^k. \quad (1)$$

Do $n^2 + 22q > 11$ nên $11^k > 11$; suy ra $k \geq 2$. Vì thế, từ (1), ta có:

$$(n^2 + 22q) : 11^2. \quad (2)$$

Do $22q : 11$ nên từ (1) suy ra, $n^2 : 11$; mà 11 là số nguyên tố, nên $n^2 : 11^2$. (3)

Từ (2) và (3) suy ra, $22q : 11^2$. Do đó, $q : 11$; mà q là số nguyên tố nên $q = 11$.

Ngược lại, với $q = 11$, ta có: $33^2 + 22 \cdot 11 = 11^2 \cdot (9 + 2) = 11^3$.

Vậy có duy nhất số q thỏa yêu cầu của đề bài là $q = 11$.

Bài 7 (1,0 điểm). Có bốn căn phòng nằm liên tiếp nhau, thành một hàng ngang. Có một con chuột trốn trong các căn phòng đó; mỗi ngày nó trốn trong một căn phòng. Có một chú mèo tìm cách bắt con chuột này. Cứ mỗi tối, mèo ta vào một căn phòng, và nếu con chuột đang trốn ở căn

phòng ấy thì nó sẽ bị mèo bắt. Biết rằng, nếu chưa bị mèo bắt mỗi sáng, con chuột lại chạy sang trốn ở căn phòng nằm ngay bên cạnh. Hỏi chú mèo có thể đảm bảo chắc chắn sẽ bắt được con chuột sau tối đa bốn tối hay không? Vì sao?

Câu trả lời là "có". Lần lượt, từ trái qua phải, đánh số thứ tự các căn phòng bởi 1,2,3,4. Với mỗi $k = 1, 2, 3, 4$, gọi căn phòng được đánh số k là "phòng k ". Trong phần trình bày dưới đây, thứ tự của các ngày được tính từ ngày đầu tiên mèo vào dãy phòng để lùng bắt chuột. Xét lịch trình lùng bắt chuột như sau của mèo:

- Tối ngày 1: Vào phòng 2 ;
- Tối ngày 2 : Vào phòng 3 ;
- Tối ngày 3: Vào phòng 3 ;
- Tối ngày 4: Vào phòng 2 .

Khi đó, nếu ngày 1, chuột trốn ở phòng 2 hoặc phòng 4, thì mèo sẽ bắt được chuột vào tối ngày 1, hoặc vào tối ngày 2 (bắt được vào tối ngày 1 nếu ngày 1 chuột trốn ở phòng 2, và bắt được vào tối ngày 2 nếu ngày 1 chuột trốn ở phòng 4).

Nếu ngày 1, chuột trốn ở phòng 1 hoặc phòng 3, thì nó sẽ thoát được mèo trong hai tối đầu tiên. Tuy nhiên, do sang ngày 3, theo cách trốn của mình, chuột sẽ lại trốn ở phòng 1 hoặc phòng 3, nên nó sẽ bị mèo bắt vào tối ngày 3, hoặc vào tối ngày 4 (bị bắt vào tối ngày 3, nếu ngày 3 nó trốn ở phòng 3; và bị bắt vào tối ngày 4, nếu ngày 3 nó trốn ở phòng 1). Vậy, với lịch trình lùng bắt nêu trên, mèo sẽ bắt được chuột, sau tối đa bốn tối. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi của bài ra là "có".

Lưu ý: Lịch trình lùng bắt trên đây không phải là lịch trình duy nhất để mèo đạt được mục tiêu đặt ra ở đề bài.

Bài 8. (0,5 điểm). Cho x, y, z là các số thực lớn hơn 2021, thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{2021}$. Chứng minh rằng, ta có bất đẳng thức sau:

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021}.$$

Từ giả thuyết đề bài suy ra $\frac{2021}{x} + \frac{2021}{y} + \frac{2021}{z} = 2$

Do đó $\frac{x-2021}{x} + \frac{y-2021}{y} + \frac{z-2021}{z} = 3 - 2 = 1$

Suy ra $x+y+z = (x+y+z) \left(\frac{x-2021}{x} + \frac{y-2021}{y} + \frac{z-2021}{z} \right) (*)$

Do $x, y, z > 2021$ nên $x - 2021, y - 2021, z - 2021 > 0$. Vì thế, bằng cách áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki cho hai bộ ba số thực dương $(\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z})$ và $\left(\frac{\sqrt{x-2021}}{\sqrt{x}}, \frac{\sqrt{y-2021}}{\sqrt{y}}, \frac{\sqrt{z-2021}}{\sqrt{z}}\right)$, từ (*) ta được:

$$x + y + z \geq (\sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021})^2$$

Do đó, $\sqrt{x + y + z} \geq \sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021}$.

(Đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \frac{6063}{2}$).

_____ **THCS.TOANMATH.com** _____